



Comprensorio  
Alpino di Caccia  
Bassa Valle Camonica

Stagione Venatoria  
2020/2021

## Relazione Prelievi



Tecnico Faunistico  
Michele Battoraro  
Stagione Venatoria 2020/2021

## Sommario

1. Introduzione .....	2
2. Lepre comune .....	3
3. Lepre Bianca .....	4
4. Fagiano di Monte.....	5
5. Cervo.....	6
6. Capriolo.....	8
7. Cinghiale .....	9

# 1. Introduzione

La stagione appena conclusa è stata per molti versi atipica. Già nel periodo primaverile le restrizioni imposte dalla ben nota emergenza sanitaria che ha colpito l'intero paese hanno limitato le diverse attività di monitoraggio delle specie cacciate che in alcuni casi sono state posticipate ma in altri non sono state portate a termine. Questo ha complicato la programmazione faunistico-venatoria di alcune specializzazioni che è comunque stata portata a termine nei tempi e nei modi richiesti.

Anche durante il periodo di apertura della caccia si sono venute a creare particolari condizioni che hanno in diversa misura limitato lo svolgimento dell'attività venatoria con chiusure, aperture parziali e apertura totale. Ciononostante, facendo un'analisi d'insieme sull'andamento della stagione venatoria appena conclusa, questa può essere considerata, nel complesso, buona.

Nella presente relazione viene riportata un'analisi conclusiva dell'andamento della stagione venatoria 2020-2021 nel comprensorio alpino di caccia "Bassa Valle Camonica". Il resoconto è stato suddiviso per specie cacciabili e comprende, per quanto possibile:

- Piano di prelievo autorizzato;
- Piano di prelievo realizzato;
- Localizzazione del prelievo;
- Analisi del prelievo.


## 2. Lepre comune

La stagione venatoria è cominciata in data 4 ottobre. Il piano di prelievo proposto e approvato per la stagione venatoria 2020-2021 è stato di 90 capi, superiore a quello dello scorso anno e in linea con i risultati ottenuti durante i monitoraggi svolti ad inizio estate.


I 176 cacciatori iscritti alla specializzazione hanno prelevato 89 capi in 9 giornate (98,9% del piano di prelievo) e la caccia è stata chiusa per evitare un molto probabile sfioramento del piano.

Piano	Prelievo
90	89

L'andamento del prelievo è stato decrescente, com'è fisiologico che sia, con numeri in media maggiori nelle prime giornate e inferiore nelle ultime.



Nel grafico a lato è riportata la localizzazione dei prelievi, suddivisi per comune. Per le prossime stagioni si suggerisce di registrarla in maniera più puntuale, al fine di avere dati più precisi ed utili da utilizzare per la pianificazione della gestione venatoria della specie (censimenti e ripopolamenti).



È importante sottolineare come, delle 89 lepri prelevate, 12 fossero lepri marcate. Un dato che rispecchia la bontà delle azioni di ripopolamento portate avanti dal Comprensorio.

Data	Comune	Località	Peso	Sex	Età	Marca	Anno rilascio
04/10/20	Piancogno	Pian d'Aprile	4500	F	A	HU6693	2019
07/10/20	Angolo T.	S. Giovanni	3980	F	A	1796	\
07/10/20	Gianico	Luca	2920	F	\	-----	\
07/10/20	Angolo T.	\	3244	M	A	HU6158	2019
07/10/20	Borno	Laveno	4000	M	A	HU6352	2019
07/10/20	Angolo T.	Padone	3043	M	A	HU6570	2019
14/10/20	Ossimo	Mignone	3500	F	\	HU89-	2018
21/10/20	Bienno	Campolaro	4000	F	J	HU6511	2019
25/10/20	Angolo T.	Prade	4500	M	A	HU6669	2019
25/10/20	Bienno	Campolaro	4500	M	A	HU8852	2018
28/10/20	Bienno	Campolaro	4000	M	A	4228	\
28/10/20	Borno	M. Altissimo	4000	F	A	HU9012	2018

Tra le lepri marcate prelevate, 3 non erano frutto dei ripopolamenti ufficiali effettuati dal comprensorio, 3 risalivano ai ripopolamenti del 2018 e ben 6 agli ultimi, ovvero quelli del 2019. La stagione appena conclusa ha confermato il trend registrato negli ultimi anni, con una popolazione di lepre comune in buono stato di conservazione.

Per quanto riguarda l'età dei capi prelevati, si è trattato di 41 adulti, 33 giovani dell'anno e 15 di età non nota. Si ricorda l'importanza di riportare correttamente l'età degli individui nei prossimi anni, essendo un dato fondamentale per valutare più nel dettaglio la salute della popolazione di lepre comune presente sul territorio del Comprensorio.

### 3. Lepre Bianca

Anche per la lepre bianca così come per la lepre comune la stagione è iniziata il 4 ottobre. Il piano di prelievo è stato completato in 4 giornate, i capi sono stati prelevati tutti in comune di Bienno ed è stata abbattuta una lepre in più rispetto al piano autorizzato.

Piano	Prelievo
5	6

5 capi su 6 erano femmine e 4 su 6 erano individui giovani dell'anno. Premesso che il campione è molto ridotto ed ha scarso valore statistico, la preponderanza di individui giovani indica uno status favorevole della specie.


LEPRE BIANCA						
Data	Comune	Località	Peso	Sex	Età	
07/10/2020	Bienno	Cava	1800	F	J	
07/10/2020	Bienno	Cava	2200	F	J	
07/10/2020	Bienno	Cava	2500	F	J	
11/10/2020	Bienno	Valdaione	1500	F	J	
14/10/2020	Bienno	Arcina	3000	F	A	
14/10/2020	Bienno	Lavena	3000	M	A	

## 4. Fagiano di Monte

Per quanto riguarda il fagiano di Monte, la stagione si è aperta il 4 ottobre ma il piano concesso di 23 capi è stato completato già dopo le prime 5 giornate. 22 capi sono stati prelevati durante la stagione venatoria mentre uno è stato abboccato da un cane durante le attività di monitoraggio post-riproduttivo. I capi sono stati prelevati tutti in sponda orografica sinistra, nei comuni di Bienno, Berzo Inferiore e Gianico.

Piano	Prelievo
23	23

Oltre al completamento del piano in poche giornate, che potrebbe essere spiegato con l'elevata pressione venatoria a cui è sottoposta la specie (potenzialmente 230 cacciatori), un dato che fornisce un'indicazione sullo status della popolazione è il rapporto tra individui giovani e adulti prelevati. Sui 23 capi registrati, solamente 4 erano adulti, ben 19 erano invece giovani dell'anno, dato che rispecchia il buon successo riproduttivo della specie nella stagione appena passata, a conferma del trend degli ultimi anni.



Data	N° Fascetta	Comune	Località	Peso	Età
-----	-----	Gianico	Rondeneto	-	J
04/10/2020	710	Berzo I.	Stabicò	1100	J
04/10/2020	910	Berzo I.	Stabicò	1100	J
04/10/2020	793	Bienno	Valdaione	1000	J
04/10/2020	735	Bienno	Arcina	1200	J
04/10/2020	538	Bienno	Valdaione	1200	A
04/10/2020	951	Bienno	Crocedomini	1092	J
04/10/2020	768	Gianico	Rondeneto	1130	J
04/10/2020	565	Gianico	Rondeneto	1138	J
04/10/2020	955	Gianico	Rondeneto	1262	A
07/10/2020	595	Berzo I.	Stabicò	1200	J
07/10/2020	612	Bienno	Arcina	1000	J
07/10/2020	607	Bienno	Arcina	1000	J
07/10/2020	614	Bienno	Arcina	1100	J
07/10/2020	709	Gianico	Rondeneto	1021	J
14/10/2020	786	Bienno	Cavallaro	1200	J
14/10/2020	744	Bienno	Roccolo	1000	J
14/10/2020	570	Bienno	Lavena	948	J
14/10/2020	908	Gianico	Cimosco	1278	A
18/10/2020	724	Bienno	Lavena	1000	J
18/10/2020	778	Bienno	Varicla	1000	J
18/10/2020	677	Bienno	Lavena	1050	A
18/10/2020	603	Bienno	Valdaione	1100	J

## 5. Cervo

La stagione venatoria è iniziata in data 15 ottobre e si è conclusa il 15 dicembre.

Il piano di prelievo del cervo è stato completato al 90%. Va ricordato che la stagione venatoria del cervo ha subito un'interruzione con successiva breve riapertura a causa delle disposizioni emanate dal legislatore in risposta all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Nella tabella è indicata la suddivisione dei capi per sesso e classe d'età.

Classe d'età	Piano		Prelievo	
	M	F	M	F
<b>0</b>	2		1	0
<b>I</b>	1	1	1	0
<b>II-III-IV</b>	3	3	3	4
<b>TOT</b>	<b>10</b>		<b>9</b>	

Dei 9 capi prelevati uno è stato abbattuto illegalmente ed è stato recuperato dalla Polizia Provinciale. 7 sono stati prelevati in sponda orografica sinistra, 2 in quella destra.

Data	N° Fascetta	Comune	Località	Sex	Classe Età
17/10/2020	64	Esine	Scandolaro	M	4
17/10/2020	231	Esine	Vallone	F	2
17/10/2020	223	Gianico	Rondeneto	M	1
19/10/2020	62	Esine	Scandolaro	M	0
05/11/2020	\	Esine	Sele	F	2
05/11/2020	63	Gianico	Luca	F	2
05/11/2020	224	Gianico	Rondeneto	F	2
12/12/2020	229	Angolo T.	Vareno	M	2
14/12/2020	47	Angolo T.	Dardi	M	3

Considerato il trend positivo del cervo a livello dell'intero arco alpino e la progressiva importanza che sta acquisendo anche a livello di Comprensorio, si sottolinea l'importanza di mantenere alti gli sforzi di gestione della specie.

## 6. Capriolo

La stagione venatoria è iniziata, per quanto riguarda i maschi, il 17 agosto e si è conclusa il 15 novembre; per quanto riguarda le femmine si è aperta il 21 settembre e si è chiusa il 15 dicembre.

Il Piano di prelievo autorizzava l'abbattimento di 8 capi ed è stato completato rispettando anche la suddivisione in sessi e classi d'età.

Classe d'età	Piano		Prelievo	
	M	F	M	F
0	0	0	0	0
I	2	2	2	2
II	2	2	2	2
<b>TOT</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	

I prelievi si sono equamente divisi tra sponda destra e sinistra del fiume Oglio, nella tabella sono indicate le rispettive località.

Data	Comune	Località	Sex	Classe Età
17/08/2020	Angolo Terme	Sorlina	M	2
17/08/2020	Berzo Inferiore	Stabicò	M	1
17/08/2020	Angolo Terme	Paros	M	1
21/09/2020	Angolo Terme	Valacort	M	2
24/09/2020	Gianico	Luca	F	2
01/10/2020	Angolo Terme	Vareno	F	1
08/10/2020	Gianico	Cimosco	F	2
03/12/2020	Darfo B. T.	Cimosco	F	1

Considerate le difficoltà sempre maggiori a cui va incontro questa specie (perdita di habitat idoneo, competizione con cervo e cinghiale, randagismo e prelievo non autorizzato), sarà necessario, già dalla prossima stagione venatoria, valutare la realizzazione di interventi di conservazione mirati al mantenimento di una popolazione di capriolo sufficientemente consistente sul territorio.

## 7. Cinghiale


La gestione del cinghiale ha subito delle importanti modifiche a partire dalla stagione venatoria 2020-2021, con l'introduzione a livello regionale dei Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (PPGC) e dei relativi Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale (IAPC).

Un'analisi dettagliata della stagione verrà fatta nell'ambito della stesura dello IAPC per la stagione 2021-2022.

Classe d'età	Piano		Prelievo	
	M	F	M	F
0 - I Striati-Rossi	12	18	9	10
II Neri	8	12	12	14
<b>TOT</b>	<b>50</b>		<b>45</b>	

Per quanto riguarda la Zona Non Idonea alla presenza della specie, cioè il territorio in sponda orografica destra del fiume Oglio, sono stati prelevati, in caccia di selezione, 45 cinghiali sui 50 autorizzati.

In tabella è riportata la struttura in sessi e classi d'età del piano e del relativo prelievo effettuato, mentre nel grafico è indicata la suddivisione dei prelievi nei diversi comuni della zona.



Per quanto riguarda la Zona Idonea alla presenza della specie, indicata come Sub Unità di Gestione F2: "Bassa Valle Camonica" il territorio è stato così suddiviso:

- Caccia Collettiva:
  - Settore 2: Esine, Berzo Inferiore;
  - Settore 3: Gianico, Darfo B. T.
- Caccia di Selezione:

- Settore 1: Bienno;
- Settore 4: Piancamuno, Artogne.

Caccia di Selezione				Caccia Collettiva					
	Piano		Prelievo			Piano		Prelievo	
Classe d'età	M	F	M	F	Classe d'età	M	F	M	F
<b>0- I</b>	5		0	0	<b>0- I</b>	8		0	0
<b>II</b>	1	2	0	0	<b>II</b>			2	0
<b>TOT</b>	8		0		<b>TOT</b>	8		2	

Gli unici due capi sono stati prelevati in caccia collettiva, uno in Comune di Darfo B. T. (località Prati di Cervera) e uno in comune di Berzo Inferiore (località Camarozzi).

Lo scarso successo del prelievo in questa zona potrebbe essere dovuto alla brevità della stagione e alla temporanea interruzione che la stessa ha subito in seguito alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria da covid-19 oltre che dalla presenza meno diffusa della specie.